

Tabel 1. Näited soovituslike intervallide kohta Prestop'i ja keemiliste fungitsiidide kasutamise vahel

Fungitsiidid			
Toimeaine	Soovituslik intervall, päevi	Toimeaine	Soovituslik intervall, päevi
Azoxystrobin	2	Mepanipyrim	0
Benomyl	4	Metalaxyl-M	0
Benthiavalicarb-isopropyl + folbet	1	Myclobutanil	0
Bitertanol	2	Myclobutanil + cyclohexanone	0
Boscalid-kresoxim-methyl	0	Myclobutanil + quinoxyfen	1
Bupirimate	0	Penconazole	1
Carboxin	4	Phosetyl-AL	0
Chlorpyrifos-methyl	0	Phosetyl-AL + propamocarp	0
Copper oxychloride	0	Potassium iodide+ potassium thiocyanate+ Addit (Enzicur+adjuvant)	2**
Cyflufenamid	0	Prochloraz	7
Cymoxanil	0	Procymidone	0
Dithianon	1	Propamocarb-hydrochloride	0
Dodemorph-acetate	0	Propiconazole+prochloraz	7
Fenhexamid	0	Pyraclostrobin+boskalid	2
Fludioxonil	4	Pyrimethanil	1
Fludioxonil-cyprodinil	4	Quinoxyfen	0
Fluopyram	0 (1)*	Spinosad	0
Guazatine	2	Sulphur	1
Hymexazole	7	Thiophanate-methyl	2
Imazalil	2	Tolclofosmethyl	2
Imidacloprid	0	Thiram	4
Iprodione	4	Triadimenol	2
Kaliumhydrogencarbonat	0	Triflumizol	0
Krezoxym-methyl	0	Trifloxystrobin-propiconazole	4
Magnesium sulphate + orange oil (Prev-Magnum)	0	Vinclozolin	4
Mancozep	4		

0 (1)* Ühepäevane intervall on nõutav, kui Prestopi ja fluopyrami kasutatakse samal taimeosal. Kui juurestikku töödeldakse fluopyramiga, võib lehestikku Prestopiga pritsida samal päeval.

2** Prestop'i võib pihustada lehestikule kaks päeva pärast Enzicur'iga töötlemist. Pärast korduvaid Enzicur'iga töötlemisi on vaja Prestop'i kasutamist korrata.

- Soovituslik intervall Prestop'i ja nimekirjas mitte mainitud keemilise aine kasutamise vahel on 7 päeva.
- Prestop'i võib kasutada segus kokkusobivate toodetega. Segu tuleks koheselt pärast valmistamist ära kasutada.
- Mitte kasutada Prestop'i paagisegus koos pestitsiidide või väetiste kontsentreeritud lahustega.

Tabel 2. Näited soovituslike intervallide kohta Prestop´i ja insektitsiidide, adjuvantide, desinfitseerimisvahendite, mikrobioloogiliste toodete ja kasvuregulaatorite kasutamise vahel.

Insektitsiidid		Abiained	
Toimeaine	Soovituslik intervall, päevi	Toode	Soovituslik intervall, päevi
Buprofezin	0	Addit	0***
Chlorpyrifos-methyl	0	Silwet Gold	0
Cypermethrin	2	Greenfain	0
Deltamethrin	0	Kasurid ja nematoodid	
Diazinon	0	Prestop´i võib kasutada koos kasurite ja nematoodidega.	
Diclorvos	7	Desinfektsioonivahendid	
Fenbutatin oxide	2	Prestop´i võib kasutada koos Resiclean´iga (kontsentratsioon < 100 ppm). Soovituslik intervall teiste desinfektsioonivahendite ja Prestopi kasutamise vahel on 1 päev.	
Imidacloprid	0	Mikrobioloogilised tooted	
Indoxacarb	0	Toimeaine/Toode	Soovituslik intervall, päevi
Malathion	0	<i>Bacillus thuringiensis</i>	0
Mevinphos	0	<i>Beauveria bassiana</i>	0
Permethrin	2	<i>Lecanicillium muscarium</i>	Prestop võib avaldada negatiivset mõju <i>Lecanicilliumi</i> kasvule lehe pinnal.
Pirimicarp	0	<i>Teised kasvusubstraati lisatavad mikrobioloogilised tooted</i>	Et vältida tarbetut konkurentsi erinevate mikroobide vahel, kasutada tooteid vaheldumisi, näiteks 7-päevaste intervallidega.
Pyrethrins	0		
Rapsiõli	0	Kasvuregulaatorid	
Spinosad	0	Toode	Soovituslik intervall, päevi
Tebufenozide	0	Pirouette	0

- 0*** Addit´it võib kasutada koos Prestop´iga maksimaalse kontsentratsiooniga 0,25%. Kõrgemad Addit´i kontsentratsioonid on Prestop´ile kahjulikud.
- Soovituslik intervall Prestop´i ja nimekirjas nimetatuta keemilise toote kasutamise vahel on 7 päeva.
- Prestop´i võib kasutada segus kokkusobivate toodetega. Segu tuleks koheselt pärast valmistamist ära kasutada.
- Mitte kasutada Prestop´i paagisegus koos pestitsiidide või väetiste kontsentreeritud lahustega.