

TAIME KASVUETAPID	enne külvi	külv/ idanemine	tärgamine	leheroseti moodustumine	varsumine	õiepungade moodustumine	õitsemine	viljumine, kõtrade moodustumine	koristamine	peale koristust
TAIME KASVUFAASID		0-9	10-20	21-27	28-50	51-60	61-70	71-99		
Teenused	Vedelsõnnik muldaviiduna									Koristusjärgne vedelsõnnik muldaviiduna (koorimine)
Seemned	Sordid: Fenja, Builder (h), Lumen, Mental, Performer, Trapper, Clearfield sordid: DK7175, INV110CL, Solar CL									
Põhi- ja pealtväetis	YaraMila 20-5-15+5 B YaraMila 18-11-13+5 B Mg NPK 18-6-18+5 Mg			2 korda YaraBela Axan 27+45 YaraBela ASN 26+14S ASN 30+7S						
Täiendväetised, biostimulaatorid	Ruter AA 2 l/ha + Humistar 2 l/ha + Final K 1 l/ha; Ruter AA 1,5 l/ha + BioSpektrum 0,25-0,5 l/ha			Trafos Mg Mn Fe B 2 l/ha; YaraVita Brassitrel Pro 2 l/ha; Nutricomplex PL 12-41-08 3-5 kg/ha; Nutricomplex 13-40-13 3-5 kg/ha			Epsotop 4-5 kh/ha; Epsotop 4-5 kg/ha; Magnitech 2 l/ha; Tradecorp Mn 0,5-1 kg/ha			
	Tradebor Mo; Tradebor 2 l/ha					Final K 2 l/ha; Nutricomplex PL 3-18-35 3-5 kg/ha; Nutricomplex PL 11-05-36 3-5 kg/ha		Delfan Plus 0,5-1 l/ha		Humistar 5 l/ha; BioSplito 1 l/ha; BioSplito 0,5 l/ha + BioSpektrum 0,25 l/ha
Taimekaitse Umbrohutõrje	Butisan Kombi 2,5 l/ha+Terraoil 200-300 ml/ha		Cleravo 0,8-1,0 l/ha+Dash 1,0 l/ha (Clearfield sortidele)		Kõrreliste tõrje Agil 100 EC 0,75 l/ha-1,5 l/ha või Targa super 0,75-2,0 l/ha			Kõdraliim Smart Contact 400ml/ha		Roundup Flex 2,25-6,0 l/ha
Kasvuregulimine ja haiguste tõrje	Salsa 15-25 g/h+ määrgaja									
	Galera 0,3 l/ha+määrgaja					Lontrel 72 SG 0,125-0,165 kg/ha				
						Caryx 0,7-1,4 l/ha, Tilmor 0,8-1,0 l/ha		Cantus Gold 0,4-0,5 l/ha, Propulse 0,8-1,0 l/ha		
Kahjurite tõrje				Fastac 50 0,2-0,3 l/ha, Cyperkill 500 EC 0,05 l/ha		Cyperkill 500 EC 0,05 l/ha, Proteus OD 0,6-0,75 l/ha, Plenum 50 WG 0,15 kg/ha			Biscaya 0,3 l/ha	
Vee pehmedaja	Spray Plus 20-40 ml/100 l vett									
										Spray Plus 20-40 ml/100 l vett

Toodete kasutusinfo aadressilt www.pma.agri.ee. Baltic Agro ei vastuta registris toimunud muudatuste eest.

HOIATUS! Õitsemisajal kasutada lubatud taimekaitsevahendeid mitte pritsida taimi mesilaste aktiivse tegevuse ajal. Õitsvat rapsi, rüpsi ja maasikat tuleb pritsida ajal, mil mesilased aktiivselt ei tegutse (kl. 22.00 – 05.00). Sama tingimus kehtib ka, kui põldudel esineb õitsvat umbrohtu. Mesilaste kaitsmise eesmärgil mitte kasutada taimede õitsemise ajal Proteus OD'd paagisegudes fungitsiididega.

