

Final eko

Kaaliumsulfaat boori ja tsingiga (EDTA)

GARANTEERITUD SISALDUS

Kaalium (K ₂ O), vees lahustuv	47,12 %
Boor (B), vees lahustuv	1,0 %
Tsink (Zn), vees lahustuv ja EDTA-ga kelaaditud	0,5 %

Tsink on stabiilne pH vahemikus 4 – 9.

NETOKAAL 5 KG

Toodetud Hispaanias:

Trade Corporation International S.A.U.
C/ Alcalá, 498. 2ª Planta
28027 Madrid (España)
Tel.: (+34) 913 273 200
www.tradecorp.com.es
e-mail: global@tradecorp.com.es

SOOVITUSED

Lehtede kaudu väetamine

Teraviljad:	1 - 2 x 2 kg / ha pea loomisest kuni õitsemise lõpuni.
Mais:	3-5 kg / ha 6-12 leheni.
Raps:	3-5 kg/ha sügisel ja 3-5 kg/ha õitsemise ajal, kuni õitsemise lõpuni.
Peet:	1-2 x 5 kg/ha pärast 10-15 lehe faasi.
Hernes-aeduba-soja:	3-5 kg/ha alates kroonlehtede varisemisest kuni kaunade paisumiseni.
Kartul:	4 x 5 kg / ha kui taimed on katnud rea ja mugulate kasvamise ajal.
Porruauk:	5 x 3-5 kg/ha kogu kasvuperioodi jooksul, eriti jämenemise faasis.
Maasikas:	4-5 x 2-3 kg/ha esimene töötlemine enne õitsemist ning viljade suurusesse kasvamise ajal.
Porgand - seller:	5 x 3 kg/ha pärast 10 lehe faasi ja viljade suurusesse kasvamise ajal.
Kapsas:	3 x 4-5 kg / ha 6 lehe faasis ja pea kasvamise ajal.
Spinat:	3 x 2-3 kg/ha iga 10 päeva tagant, kui lehed katavad rea, lõpetage 15 päeva enne saagikoristust.
Seemneviljalised:	4 x 2,5-3 kg/ha viljade moodustumise algusest kuni 3-4 nädalat enne saagikoristust.
Luuviljalised:	4 x 2,5-3 kg/ha viljade moodustumise algusest kuni 3-4 nädalat enne saagikoristust.
Kirss:	2 x 3 kg/ha viljade moodustumise algusest, korrata 10-15 päeva möödudes.
Koristamisjärgselt:	4-5 kg/ha saagikoristusest kuni lehtede langemiseni.

Kasutage vähemalt 200 liitrit vett hektari kohta.

SEGATAVUS

Final eko sobib kokku enamike kasutatavate väetiste ja taimekaitsevahenditega. Ärge segage kaltsiumi ja magneesiumi sisaldavate toodetega. Soovitav on kasutada neid tooteid vaheldumisi. Ärge ületage toote lahustuvuspiiri, mis on 100 g/l 25 ° C juures. Ärge kasutage paagisegudes rohkem kui kahte toodet. Et saavutada maksimaalset efektiivsust, pritsige kuivi lehti. Pärast töötlemist peab olema 3 - 4 tundi ilma vihmata, et kindlustada optimaalne lehtedesse imendumine. Enne segamist tehke väikeses koguses sobivustest.

HOIATUSED, KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE

Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet. Sisaldab boorhapet. Enne kasutamist lugege spetsiaalseid juhiseid. Ärge käideldge toodet enne, kui olete tutvunud kõikide ettevaatusabinõudega ja neist aru saanud. Kandke kaitsekindaid ja kaitsevahendeid silmade ja näo kaitsmiseks. Kokkupuute korral või kui kahtlustate kokkupuudet: pöörduge arsti poole. Hoidke lukustatuna. Kõrvaldage sisu/mahuti, kasutades selleks ettenähtud kohti. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Ärge sööge, jooge ega suitsetage toote käitlemise ajal. Säilitage kuivas, jahedas kohas kaitstuna ekstreemsete temperatuuride eest. Hoidke ainult originaalpakendis. Kasutage toodet vastavalt etiketil toodud juhistele. Kahtluse korral küsige nõu edasimüüja esindajalt Eestis. Toode on ette nähtud kasutamiseks professionaalsetele kasutajatele.

Kasutage vaid kindlaks tehtud vajaduse korral. Ärge ületage soovituslikke norme.



SUUR TERVISEOHT

Tootmiskuupäev:

Partii number:

Aegumiskuupäev: 4 aastat pärast tootmiskuupäeva.

Toode on heaks kiidetud mahepõllumajanduses kasutamiseks vastavalt määrustele (EÜ) 834/2007 ja (EÜ) 889/2008. Kontrollitud ECOCERT SA F-32600 poolt.