

ZM-GROW

JUHISED

JÄRGIGE ALATI ETIKETIL OLEVAID JUHISEID

Enne kasutamist toodet põhjalikult segada. Et kindlustada mikrotoitaineid sisaldava vedelväetise efektiivne kasutamine leheväetisena, tuleks läbi viia mulla- ja taimeanalüüsid. Mikrotoitaineid sisaldava vedelväetise vajadus ja kasutuskogus tehakse kindlaks analüüside tulemuste põhjal. Kasutuskogus on tavaliselt umbes 1-3 l/ha kohta. ZM-Grow on kontsentraat. Enne kasutamist lahjendada 1-3 l kontsentraati vähemalt 200 liitri veega. Toodet võib kasutada sobivate pihustite või kastmistorude kaudu. Soovitame jälgida, et toote temperatuur kasutamise ajal oleks üle +5°C.

OHUTUSJUHEND Toodet käsitlemisel kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid (looduslik kumm või looduslik lateks, nitrilkkumm, butüülkkumm või PVC) ja silmade kaitsevahendeid. Vajadusel kasutada hingamisteede kaitsevahendeid (vähemalt A2P3 filtriga). Pihustatud ainet mitte sisse hingata. Tagada piisav ventilatsioon. Soovitav on tagada silmade loputamise võimalus ja piisavate pesemisvahendite kättesaadavus. Pesta käsi pärast kasutamist. Vältida toote käitlemise ajal söömist ja joomist. Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödadest. Mitte kunagi ei tohi avada surve all olevat konteinerit.

HOIUSTAMINE Meie tooted on testitud temperatuuril vahemikus -10°C ja +45°C. Hoiustada tihedalt suletuna originaalkonteineris või –pakendis. Hoida konteinerit kuivas, hästi ventileeritavas kohas. Soovitame hoiustada külmavabas kohas temperatuuril vahemikus +2 – +45°C. Anorgaanilisi väetiseid ei tohi hoiustada samas ruumis koos kergestisüttivate ja plahvatusohtlike ainetega. Hoida eemal oksüdantidest, metallidest ja hapetest.

MÜÜGITINGIMUSED Toodet müüakse vastavalt Tracegrow üldistele müügitingimustele, mis on taotluse korral kättesaadavad. Toodet kasutades nõustub kasutaja nende müügitingimustega.

KASUTAMINE JA AJASTUS

HEINTAIMED (KARJAMAA): 2-3 l/ha 10 – 14 päeva enne karjatamist. Vajadusel tegevust 10-14 päeva tagant korrata. **TÄHELEPANU:** väetamise ja karjatamise vahele peab jääma 10 päeva. Vee kogus: vähemalt 200 l/ha.

HEINTAIMED (SILO/HEIN): 2-3 l/ha kevadel kohe kasvu alguses. Vajadusel korrata 10-14 päeva tagant või peale igat niidet uue saagi kasvu alguses. Vee kogus: vähemalt 200 l/ha.

TERAVILJAD: 2-3 l/ha alates kolme lehe faasist kuni lipulehe faasini. Mõõduka kuni tõsise toitainete puuduse korral teostada teistkordne väetamine 7-14 päeva pärast. Vee kogus: vähemalt 200 l/ha.

HOIATUS

H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H373: Võib kahjustada elundeid (aju) pikaajalisel või korduval kokkupuutel sissehingamisel.

H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Udu, auru või pihustatud ainet mitte sisse hingata. Kanda kaitsekindaid, kaitseriietust ja silmade kaitsevahendeid.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist. Võtta viivitamatult ühendust MÜRGIKUSKESKUSE /arstiga. Koguge leke. Sisu kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

Tootja: Tracegrow Oy, Teollisuustie 21, 86710 Kärsämäki, FINLAND, Tel: +358 40 771 9070